



CALENDÁRIO DE VACINAS – ADOLESCENTE

IDADE	VACINA	ESQUEMA	OBSERVAÇÃO
11 anos a 19 anos	Tríplice Viral “SCR”	2 doses	É considerado protegido o adolescente que tenha recebido duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas. OBS: Vacina contraindicada para gestantes
	Hepatite A e B combinada	Hepatite A: Duas doses com intervalo de 6 meses. Hepatite B: Três doses sendo 0 – 1 mês após – 6 meses após a 1a. dose. Hepatite A e B: * Para menores de 16 anos: duas doses com intervalo de 6 meses. * Para menores de 16 anos: 3 doses sendo 0 – 1 mês após – 6 meses após a 1a. dose.	Adolescentes não vacinados na infância para as hepatites A e B devem ser vacinados o mais precocemente possível para essas infecções. A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B
	HPV	Vacina Quadrivalente contra HPV / Lab MSD: 3 doses sendo 0 – 2 meses após – 6 meses após a 1a. dose. Vacina Bivalente contra HPV / Lab GSK: 3 doses sendo 0 – 1 mês após – 6 meses após a 1a. dose.	Vacina Quadrivalente contra HPV / Lab MSD: Indicada para meninos e meninas. Vacina Bivalente contra HPV / Lab GSK: Indicada apenas para meninas.
	DTPa / dTpa	Com esquema de vacinação básico para tétano completo: Reforço a partir dos 11 anos com dTpa a cada sete a dez anos após a última dose. Com esquema de vacinação básico para tétano incompleto: Uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Em ambos os casos: Na impossibilidade do uso da vacina dTpa, substituí-la pela vacina dT; e na impossibilidade da aplicação das outras doses com dT, substituí-la pela vacina dTpa, completando três doses da vacina com o componente tetânico.	O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, para adolescentes e adultos, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da bactéria Bordetella pertussis, principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, ou na falta de dTpa, recomendar a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).
	Varicela	Duas doses com intervalo de três meses em menores de 13 anos, e intervalo de um a três meses em maiores de 13 anos.	Recomendada para aqueles sem história de infecção prévia. Até a idade de 12 anos, considerar a aplicação de vacina combinada quádrupla viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) para os adolescentes suscetíveis à varicela. Contraindicada para imunodeprimidos e gestantes.
	Gripe	Dose única anual.	Recomendada para todos os adolescentes.
	Meningite tipo A/C/W135/Y	Aos 11 anos, seguida de uma dose de reforço cinco anos depois.	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.
	Meningite tipo B	Duas doses com intervalo de 1 mês.	
	Pneumonia	Pneumo 23 valente: 2 doses com intervalo de 5 anos entre elas.	Em casos especiais (pacientes com doenças crônicas) e com prescrição médica, considerar a vacina Pneumocócica conjugada 13 valente “Prevenar 13” em dose única.
Dengue	3 doses sendo 0 – 6 meses após – 12 meses após a 1a. dose.		