



CALENDÁRIO DE VACINAS – ADULTOS HOMENS

IDADE	VACINA	ESQUEMA	OBSERVAÇÃO
20 anos a 45 anos	Dengue	3 doses sendo 0-6 meses após 12 meses após a 1a. dose.	
20 anos a 50 anos	Meningite tipo B	Duas doses com intervalo de 1 mês	
20 anos a 59 anos	Tríplice Viral “SCR”	2 doses	É considerada protegida a mulher que tenha recebido, em algum momento da vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas. OBS: Vacina contraindicada para gestantes
	Hepatite A e B combinada	Hepatite A/B combinada: 3 doses sendo 0 – 1 mês após – 6 meses após a 1a. dose Hepatite A: 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas Hepatite B: 3 doses sendo 0 – 1 mês após – 6 meses após a 1a. dose	Homens não imunizados anteriormente para as hepatites A e B devem ser imunizados. A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.
	HPV Quadrivalente	3 doses sendo 0 – 2 meses após – 6 meses após a 1a.dose.	Indicada para indivíduos entre 9 e 26 anos
	DTPa / dTpa	Com esquema de vacinação básico para tétano completo: Reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: Uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dTpa de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.	O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, para adolescentes e adultos, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da bactéria Bordetella pertussis, principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, ou na falta de dTpa, recomendar a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). OBS: Gestantes podem receber apenas a dTpa.
	Varicela	Duas doses com intervalo de um a três meses entre elas.	Recomendada apenas para adultos sem história anterior de varicela. OBS: contraindicada para gestantes.
	Gripe	Dose única anual	
	Meningite tipo A/C/W135/Y	Dose única	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.
	Pneumonia	Pneumo 23 valente: 2 doses com intervalo de 5 anos entre elas Pneumo 13 valente: Somente para indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos Dose única	
Herpes Zoster	Dose única	Vacina licenciada a partir dos 50 anos. Recomendada mesmo para aqueles que já apresentaram quadro de herpes zóster. Nesses casos, aguardar intervalo mínimo de seis meses e preferencialmente de um ano, entre o quadro agudo e a aplicação da vacina.	