



me50
PERÍCIAS MÉDICAS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CALENDÁRIO DE VACINAS – ADULTOS IDOSOS

IDADE	VACINA	ESQUEMA	OBSERVAÇÃO
60 anos	Tríplice Viral “SCR”	2 doses	É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido, em algum momento da vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas. OBS: A indicação deve ser em situações de risco aumentado.
	Gripe	Dose única anual	
	Pneumonia	Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23 seis a doze meses depois, e uma segunda dose de VPP23 cinco anos depois da primeira.	
	DTPa / dTpa	Com esquema de vacinação básico para tétano completo: Reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: Uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dTpa de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.	O indivíduo com mais de 60 anos é considerado de risco para as complicações relacionadas à coqueluche. A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a doença, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente. Na impossibilidade de acesso à vacina dTpa, deve ser recomendada vacina dTpa-VIP.
	Hepatite A e B combinada		
	Meningite tipo A/C/W135/Y	Dose única	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.
	Herpes Zoster	Dose única	Recomendada mesmo para aqueles que já apresentaram quadro de herpes zóster. Nesses casos, aguardar intervalo mínimo de seis meses e preferencialmente de um ano, entre o quadro agudo e a aplicação da vacina.